

[illegible]

## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no Cartão de Respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do Cartão de Respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta.** ✓

02) Alternativa errada.

04) Alternativa errada.

08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	9



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.

02) **Alternativa correta.** ✓

04) **Alternativa correta.** ✓

08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** A Reforma Sanitária Brasileira, iniciada na década de 1970, criticava o modelo previdenciário de atenção à saúde – excludente e fragmentado – e culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986). Sobre esse processo, assinale o que for correto.

- 01) A Reforma Sanitária defendia a saúde como direito universal e dever do Estado, contrapondo-se ao modelo previdenciário vigente até então.
- 02) A Constituição de 1988 não incorporou as propostas da Reforma Sanitária, mantendo a saúde vinculada apenas à previdência social.
- 04) O movimento da Reforma Sanitária ocorreu na esfera acadêmica, sem articulação com movimentos sociais ou participação popular.
- 08) A 8ª Conferência Nacional de Saúde consolidou a proposta de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade.

☐

**02-** Um município brasileiro apresenta elevados índices de internações por doenças diarreicas em crianças menores de cinco anos. O relatório epidemiológico aponta que grande parte da população vive em áreas sem saneamento básico, com coleta de lixo irregular e baixa escolaridade materna. Além disso, há concentração de famílias em ocupações precárias e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Com base no caso descrito, assinale o que for correto.

- 01) As condições de saneamento, moradia e escolaridade materna configuram determinantes sociais que influenciam diretamente o processo saúde-doença observado.
- 02) A dificuldade de acesso aos serviços de saúde agrava a vulnerabilidade das crianças, limitando a prevenção e o tratamento adequado.
- 04) A alta incidência de doenças diarreicas pode ser explicada pela alta circulação de microrganismos patogênicos, sem relação com fatores sociais ou ambientais.
- 08) A situação descrita evidencia que desigualdades sociais produzem iniquidades em saúde, tornando determinados grupos populacionais mais expostos e suscetíveis às doenças.

☐

**03-** Durante visita domiciliar realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família, uma agente comunitária identificou um idoso hipertenso e diabético, que recentemente recebeu alta hospitalar após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O paciente apresenta limitações motoras, necessidade de acompanhamento multiprofissional e dificuldades socioeconômicas. A família, pouco informada sobre os cuidados, solicitou orientações e apoio. Considerando o princípio da integralidade da assistência no SUS, assinale o que for correto.

- 01) O encaminhamento para fisioterapia, acompanhamento multiprofissional (médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro) e apoio domiciliar expressa a integralidade, ao articular ações de reabilitação e recuperação.
- 02) A integralidade é alcançada por meio da atenção básica, não sendo necessária a incorporação dos serviços de média e alta complexidade.
- 04) A integralidade implica também orientar a família sobre o autocuidado e a prevenção de complicações, articulando promoção e prevenção à reabilitação do paciente.
- 08) A integralidade se concretiza com o tratamento hospitalar adequado ao paciente durante a fase aguda do AVC, sendo dispensada a articulação com outros níveis de atenção.

☐

**04-** Um médico veterinário sanitaria foi convidado a participar de um seminário sobre políticas públicas de saúde indígena. Durante a apresentação, destacou que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra o SUS, com princípios próprios que respeitam especificidades culturais e garantem a articulação com a rede geral de serviços de saúde. Considerando a Lei nº 8.080/1990 e suas alterações, assinale o que for correto.

- 01) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve funcionar de forma integrada ao SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
- 02) O Subsistema pode desconsiderar práticas culturais, como saberes tradicionais, sempre que não coincidirem com o modelo biomédico hegemônico, já que a prioridade é padronizar protocolos clínicos para as populações indígenas.
- 04) O financiamento do Subsistema é de responsabilidade da União, podendo contar com participação complementar de Estados, Municípios e instituições governamentais e não governamentais.
- 08) A participação dos povos indígenas em instâncias colegiadas de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde (como Conselhos de Saúde) é direito garantido pela lei.

☐

**05-** A Portaria nº 1.378/2013 regulamenta a Política Nacional de Vigilância em Saúde no âmbito do SUS, estabelecendo princípios, diretrizes e responsabilidades. Com base nesse documento, assinale o que for correto.

- 01) A Vigilância em Saúde deve articular ações de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, em saúde do trabalhador e da situação de saúde da população, com caráter integrador e intersetorial.
- 02) Entre seus princípios estão: integralidade, descentralização, participação social, direito à informação e uso da epidemiologia para análise da situação de saúde.
- 04) A organização da Vigilância em Saúde deve ser descentralizada, hierarquizada e regionalizada, garantindo a integração entre os serviços e a atuação contínua em todos os níveis de atenção.
- 08) A Política Nacional de Vigilância em Saúde prevê a produção, análise e disseminação de informações em saúde como base para a tomada de decisão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços.

☐

**06-** Com base nos marcos legais do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A regionalização concentra a gestão dos serviços de saúde nos estados, substituindo a descentralização municipal.
- 02) A descentralização busca aproximar a gestão dos serviços de saúde dos usuários, sendo os municípios os principais responsáveis pela execução das ações.
- 04) A integralidade no SUS envolve o reconhecimento das necessidades dos usuários e a articulação das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
- 08) A participação da comunidade se concretiza por meio dos conselhos e conferências de saúde, garantindo representação social na gestão do SUS.

☐

**07-** Com base nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e sua relação com as iniquidades em saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais da saúde consideram apenas aspectos ambientais e não incluem variáveis socioeconômicas e educacionais.
- 02) A atuação sobre os determinantes sociais deve ser responsabilidade primária do setor saúde, sem necessidade de articulação com outras políticas públicas.
- 04) A compreensão dos determinantes sociais da saúde permite que políticas públicas atuem nas causas estruturais das iniquidades, extrapolando a oferta de serviços de saúde curativos.
- 08) Fatores como renda, escolaridade, raça, moradia e trabalho influenciam diretamente o processo saúde-doença e a expectativa de vida da população.

☐

**08-** As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no SUS visando superar a fragmentação da atenção e efetivar a integralidade do cuidado. Com base em suas características e diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) As RAS devem ser organizadas com base no reconhecimento dos territórios, a partir das necessidades de saúde das populações adscritas.
- 02) A Atenção Primária à Saúde é reconhecida como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede, sendo a principal porta de entrada do SUS.
- 04) Um dos mecanismos de articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde dentro das RAS é o sistema de referência e de contrarreferência.
- 08) As RAS são estruturas organizadas exclusivamente em hospitais de média e alta complexidade, sendo acessadas após regulação estadual.

☐

**09-** O planejamento estratégico é um instrumento fundamental para a gestão e organização de sistemas e serviços de saúde, permitindo decisões mais assertivas. Com base em suas diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento estratégico parte da compreensão da realidade para definir objetivos, metas e estratégias voltadas à transformação das situações de saúde.
- 02) A análise situacional é uma etapa central do planejamento estratégico, pois permite gerar um diagnóstico amplo de natureza social, organizacional e de saúde.
- 04) O planejamento estratégico orienta a tomada de decisão com base em prioridades pactuadas coletivamente, considerando as oportunidades e a capacidade de intervenção dos sujeitos.
- 08) Diferentemente dos padrões normativos, o planejamento estratégico em saúde reconhece a complexidade dos territórios e valoriza a participação de diversos atores na construção das ações.

☐

**10-** A vigilância em saúde impõe articulação entre ações de monitoramento, prevenção e controle de riscos à saúde. Com base nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância hospitalar atua de forma independente das demais esferas da vigilância em saúde, sendo voltada exclusivamente ao ambiente intra-hospitalar.
- 02) A vigilância em saúde na atenção terciária contribui para a segurança do paciente e a qualidade do cuidado.
- 04) A notificação compulsória de agravos e doenças deve ser realizada também em serviços hospitalares, como parte das responsabilidades clínicas e éticas das equipes de saúde.
- 08) Nos hospitais, as ações de vigilância se restringem ao monitoramento de infecções, não envolvendo vigilância epidemiológica, sanitária ou eventos adversos.

☐

### QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** Indicadores de qualidade são utilizados como ferramenta de mensuração do resultado assistencial. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Incidência de quedas de pacientes.
- 02) Incidência de lesão por pressão.
- 04) Incidência de flebite.
- 08) Incidência de estresse.

☐

**12-** O Processo de Enfermagem organiza-se em etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. De acordo com suas etapas, assinale o que for correto.

- 01) Planejamento de enfermagem compreende a realização das intervenções.
- 02) Avaliação de enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos e objetivos.
- 04) Diagnóstico de enfermagem compreende a identificação de problemas existentes.
- 08) Evolução de enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados.

☐

**13-** A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma infecção relacionada à assistência à saúde que ocorre em 10% a 20% dos pacientes ventilados mecanicamente na Unidade de Terapia Intensiva. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) É preciso realizar higiene oral com antissépticos, elevação da cabeça, mensuração do cuff e protocolos de interrupção diária da sedação.
- 02) Pacientes submetidos à ventilação mecânica estão livres de risco de infecção respiratória.
- 04) PAV é a pneumonia que ocorre em pacientes após 48 horas ou mais de ventilação mecânica invasiva.
- 08) Uso de ventilação mecânica por período prolongado, reintubação e sedação excessiva não são fatores que aumentam o risco de PAV.

☐

**14-** Sobre a iniciativa "Cirurgias Seguras Salvam Vidas", assinale o que for correto.

- 01) É uma das metas internacionais de segurança do paciente, promovidas pela Organização Mundial da Saúde.
- 02) O checklist foi criado para substituir os protocolos existentes nas instituições.
- 04) Foi desenvolvido um *checklist* padronizado, aplicável a todos os países e contextos, para melhorar a segurança cirúrgica.
- 08) A iniciativa foca medidas para prevenir erros como cirurgia em local errado, uso de agentes anestésicos sem segurança e não prevenção de infecções.

☐

**15-** De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, assinale o que for correto.

- 01) Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem.
- 02) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem.
- 04) Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas.
- 08) Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas.

☐

**16-** A higienização das mãos é considerada a medida mais eficaz na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Identifique a(s) alternativa(s) correta(s) que representa(m) corretamente as indicações de higienização das mãos, segundo a Organização Mundial da Saúde e assinale o que for correto.

- 01) Antes do contato com o paciente; antes de procedimentos limpos/assépticos; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; após contato com áreas próximas ao paciente.
- 02) Não tem indicação de higienizar as mãos antes de entrar no quarto; antes de usar equipamentos; após tocar em roupa de cama; após calçar luvas; após anotar informações não tem indicação de higienizar as mãos.
- 04) Sem recomendação de higienizar as mãos antes de entrar no hospital; antes de se alimentar; após tocar em superfícies; ao acordar; ao dormir.
- 08) Após retirar luvas de procedimentos ou luvas estéreis, é indispensável a higienização das mãos, utilizando água e sabonete ou álcool em gel 70%, conforme a situação.

☐

**17-** Para pacientes que possuam alto grau de dependência, seja pelo estado clínico crítico, pouca mobilidade e/ou pelos diversos dispositivos invasivos instalados, o banho no leito revela-se a opção para a manutenção da higiene e redução de odores corporais, porém seus benefícios vão além disso. Nesse contexto assinale o que for correto.

- 01) Promove estimulação da circulação sanguínea.
- 02) Ativação da superfície cutânea e extremidades.
- 04) Alívio do desconforto e melhora da autoimagem.
- 08) Relaxamento muscular com consequente restabelecimento da amplitude de movimento.

☐

**18-** O sistema de vigilância epidemiológica das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é realizado por meio da obtenção de dados dos pacientes assistidos pelo serviço de saúde, a fim de elaborar indicadores. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A coleta e análise de dados epidemiológicos têm como finalidade direcionar ações de prevenção e controle de IRAS.
- 02) O indicador epidemiológico de infecção primária da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central é definido como densidade de incidência e reflete uma probabilidade relativa, visto que considera o tempo de exposição do paciente.
- 04) O indicador epidemiológico de infecção primária da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central é definido como taxa de infecções.
- 08) Os diagnósticos de IRAS são baseados em critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cuja última revisão ocorreu em 2025.

☐

**19-** O ponto mais crítico do processamento de produtos para saúde é a fase da limpeza que consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde (PPS), utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada). Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Não desmontar um instrumental antes de colocar na lavadora ultrassônica para limpeza automatizada.
- 02) Fazer enxágue completo com água da osmose reversa.
- 04) Preencher todos os lumens.
- 08) A limpeza deve iniciar tão logo quanto possível, preferencialmente, já no ponto de uso, para evitar, ao máximo a formação de biofilmes.

☐

**20-** Considerando os critérios para alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica em cirurgias ambulatoriais, assinale o que for correto.

- 01) Sangramento aparente.
- 02) Dor moderada.
- 04) Sinais vitais estáveis por no mínimo uma hora.
- 08) Nível de consciência: orientação no tempo e no espaço.

☐

**21-** Segundo a Portaria 2862/2023, que estabelece critérios para o atendimento de pacientes críticos, graves, de alto risco, ou de risco moderado, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e considerando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem sobre as ações privativas do enfermeiro. Analise as alternativas sobre as competências do enfermeiro e assinale o que for correto.

- 01) Coordenação do corpo técnico assistencial multiprofissional, além da equipe de enfermagem e administrativa.
- 02) A direção, organização, coordenação, planejamento, execução e avaliação dos serviços de enfermagem.
- 04) Garantir o correto dimensionamento da equipe de enfermagem, sendo para UTI adulto tipo II: (um) enfermeiro coordenador, com jornada mínima de 4 horas diárias, podendo acumular o papel de enfermeiro rotineiro, com habilitação em Terapia Intensiva comprovada por título.
- 08) Garantir o dimensionamento de: 1 (um) enfermeiro plantonista para cada 12 (doze) leitos ou fração em cada turno; técnicos de enfermagem: no mínimo 1 (um) para cada 2 (dois) leitos em cada turno.

☐

**22-** No contexto da saúde do idoso em cuidado perioperatório, a equipe de enfermagem deve adotar condutas específicas para reduzir riscos e promover segurança. Assinale o que for correto.

- 01) O risco de delirium no pós-operatório é raro em idosos e, portanto, não justifica protocolos específicos de prevenção, como a reorientação frequente, a adequação do ambiente e o manejo da dor.
- 02) Pacientes idosos apresentam maior risco de complicações no pós-operatório, devido à redução da complacência pulmonar, cardíaca e renal, bem como da capacidade vital.
- 04) A avaliação pré-operatória do idoso deve considerar a polifarmácia e as possíveis interações medicamentosas, pois o uso concomitante de fármacos pode aumentar o risco de eventos adversos no perioperatório.
- 08) A avaliação do estado nutricional é essencial, visto que a desnutrição em idosos está associada a maior incidência de infecção, atraso na cicatrização e maior tempo de internação.

☐

**23-** Sobre os cuidados de enfermagem à mulher no período gestacional e puerperal, e ao recém-nascido (RN), assinale o que for correto.

- 01) O momento ideal para colocar o bebê para fazer a primeira mamada é duas horas após o nascimento, pois assim a mulher já está mais reestabelecida do parto e produz melhor o hormônio da ocitocina.
- 02) O controle da temperatura da sala de parto é um cuidado de enfermagem essencial, pois o estresse causado pela exposição ao frio causa problemas fisiológicos e metabólicos ao bebê, como a vasoconstrição pulmonar e periférica, que resulta em diminuição na captação pulmonar de oxigênio aos tecidos e intensa glicólise anaeróbica, podendo levar à acidose metabólica. Assim, quando o consumo de oxigênio aumenta em resposta à hipotermia, a frequência respiratória do RN também aumenta.
- 04) Devido ao controle da sífilis, não se faz necessário o rastreio desta doença no período gestacional e puerperal.
- 08) Os cuidados de enfermagem no parto humanizado priorizam o protagonismo da mulher, o respeito às suas decisões e direitos, além da oferta de um ambiente seguro e acolhedor. Isso envolve fornecer apoio psicológico e emocional, orientar a gestante e seus familiares sobre o processo, evitar intervenções desnecessárias, favorecer o parto seguro, estimular o contato pele a pele e assegurar a presença do acompanhante escolhido.

☐

**24-** Com relação à Resolução COFEN nº 736/2024, que dispõe sobre o Processo de Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem.
- 02) Segundo essa resolução, as etapas do Processo de Enfermagem são: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação.
- 04) O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suportes teóricos, que podem estar associados entre si, como teorias e modelos de cuidado, sistemas de linguagens padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, tais como estruturas teóricas, conceituais e operacionais que forneçam propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base.
- 08) O Planejamento de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a pessoa, à família, à coletividade, e a grupos especiais, compartilhado com os sujeitos do cuidado e com a equipe de Enfermagem e saúde.

☐

**25-** Quanto à consulta de enfermagem baseada em uma teoria de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Ao avaliar o paciente segundo a teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, o enfermeiro deve considerar aspectos biopsicossociais e espirituais do paciente, da família e/ou da coletividade humana para delinear diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem.
- 02) Ao avaliar o paciente segundo a teoria de Callista Roy, o enfermeiro deve considerar a promoção da adaptação dos indivíduos e grupos nos quatro modos adaptativos: físico-fisiológico, identidade de autoconceito, interdependência e desempenho de papel.
- 04) Ao avaliar um paciente segundo a teoria de Florence Nightingale, o enfermeiro deverá focar suas ações no autocuidado.
- 08) Ao avaliar um paciente segundo a teoria de Martha Rogers, o enfermeiro deverá buscar evidências da dimensão do corpo físico do ser humano que não interage com o ambiente em que vive para fundamentar sua prescrição de cuidados.

☐

**26-** A equipe de enfermagem perioperatória desempenha papel central na prevenção de eventos adversos relacionados à segurança do paciente. Sobre as medidas de cuidado, assinale o que for correto.

- 01) A profilaxia antibiótica, quando indicada, deve ser administrada preferencialmente após duas horas da indução anestésica e da incisão cirúrgica.
- 02) O registro de intercorrências perioperatórias somente é obrigatório para pacientes cirúrgicos nas situações de óbito ou parada cardiorrespiratória, não sendo necessário em eventos adversos de menor gravidade.
- 04) A utilização de dispositivos adequados em proeminências ósseas no intraoperatório, assim como a mobilização correta do paciente, auxilia na prevenção de lesões perioperatórias decorrentes do posicionamento cirúrgico, além de promover adequada perfusão e circulação, protegendo músculos, nervos e proeminências ósseas.
- 08) O uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura contribui para a comunicação efetiva da equipe e redução de eventos adversos, devendo ser aplicada em três momentos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída da sala.

☐

**27-** As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), em especial a Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), representam importante causa de morbimortalidade. Considerando princípios de epidemiologia e medidas de prevenção e controle, analise as alternativas e assinale o que for correto.

- 01) O tempo cirúrgico prolongado e a hipotermia do paciente aumentam o risco de infecção.
- 02) O tempo ideal para administração da antibioticoprofilaxia cirúrgica é de 30 a 60 minutos antes da incisão, garantindo concentração tecidual eficaz para evitar infecções, podendo variar a depender do fármaco.
- 04) A capacitação regular da equipe cirúrgica não se demonstra como medida efetiva para o controle da infecção perioperatória.
- 08) O controle rigoroso da glicemia no perioperatório, especialmente em pacientes diabéticos, está associado à redução da incidência de infecções de sítio cirúrgico.

☐

**28-** Em um hospital geral, durante o plantão noturno, a equipe está reduzida. Por solicitação do enfermeiro, a auxiliar de enfermagem é direcionada para a UTI, onde realiza aspiração em um paciente com traqueostomia devido a câncer de esôfago. O técnico de enfermagem, enquanto isso, fica responsável por auxiliar na busca de materiais na central de materiais e na farmácia. Neste momento, o médico solicita a outro técnico de enfermagem que colete a gasometria arterial do paciente durante o intervalo do enfermeiro, sendo a punção realizada sem intercorrências. Considerando a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem, analise o caso e assinale o que for correto.

- 01) A aspiração traqueal é um procedimento de maior complexidade, não sendo atribuição do auxiliar de enfermagem, mas do enfermeiro ou técnico de enfermagem sob supervisão ou mediante prescrição do enfermeiro.
- 02) A coleta de gasometria arterial é procedimento que pode ser executado pelo médico, enfermeiro ou bioquímico, sendo inadequada a sua realização autônoma por técnico de enfermagem, mesmo que sem intercorrências.
- 04) O enfermeiro é responsável ético e legal pela supervisão e dimensionamento da equipe de enfermagem, devendo estar atento a estas demandas. Deste modo, cuidados em pacientes críticos (como o ambiente de UTI) não devem ser executados por auxiliares de enfermagem, conforme Lei do Exercício Profissional.
- 08) A solicitação direta do médico a técnicos ou auxiliares para execução de procedimentos privativos do enfermeiro é eticamente aceitável, desde que não haja prejuízo imediato ao paciente.

☐

**29-** Em uma unidade hospitalar, um técnico de enfermagem descarta uma agulha utilizada em um paciente em saco branco leitoso, junto com compressas com sangue. No mesmo plantão, uma auxiliar de enfermagem deposita os frascos de medicamentos vencidos na lixeira de resíduos comuns. O enfermeiro, ao verificar o setor, orienta a equipe sobre os erros cometidos. Considerando a RDC nº 222/2018, assinale o que for correto.

- 01) O descarte de agulhas deve ser feito exclusivamente em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, identificados com símbolo de risco biológico, sendo incorreto o acondicionamento em saco branco.
- 02) Os medicamentos vencidos são classificados como resíduos químicos (Grupo B) e não podem ser descartados junto ao lixo comum, devendo seguir tratamento e destinação específicos.
- 04) Em situações de sobrecarga da equipe de enfermagem, é permitido o descarte de resíduos químicos e perfurocortantes em saco branco leitoso, contanto que estejam corretamente identificados.
- 08) As compressas com sangue são resíduos do Grupo A (infectantes) e devem ser acondicionadas em saco branco leitoso identificado com símbolo de risco infectante. Os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais.

☐

**30-** Um paciente em surto psicótico apresenta agitação psicomotora intensa, colocando em risco sua integridade física e a de terceiros. Após esgotadas as medidas de contenção verbal, o médico prescreve contenção mecânica, a ser realizada pela equipe de enfermagem. De acordo com as diretrizes éticas, legais e assistenciais, assinale o que for correto.

- 01) A contenção mecânica somente deve ser utilizada como último recurso, quando todas as outras medidas terapêuticas se mostrarem ineficazes para garantir a segurança do paciente, da equipe e de terceiros.
- 02) Os técnicos de enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados.
- 04) Durante a contenção mecânica, é obrigatória a monitorização clínica do paciente, incluindo nível de consciência, dados vitais, condições de pele e circulação sanguínea nos locais e membros contidos. Essas avaliações devem ser realizadas regularmente, observando protocolos institucionais e regulamentações vigentes, garantindo a segurança e integridade do paciente.
- 08) O uso da contenção mecânica deve ser registrado detalhadamente em prontuário, incluindo justificativa, horário de início e término, profissionais envolvidos, estado das condições psicobiológicas do paciente e suas reavaliações periódicas.

☐