

[illegible]

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no Cartão de Respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do Cartão de Respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta.** ✓

02) Alternativa errada.

04) Alternativa errada.

08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	9



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.

02) **Alternativa correta.** ✓

04) **Alternativa correta.** ✓

08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- A Reforma Sanitária Brasileira, iniciada na década de 1970, criticava o modelo previdenciário de atenção à saúde – excludente e fragmentado – e culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986). Sobre esse processo, assinale o que for correto.

- 01) A Reforma Sanitária defendia a saúde como direito universal e dever do Estado, contrapondo-se ao modelo previdenciário vigente até então.
- 02) A Constituição de 1988 não incorporou as propostas da Reforma Sanitária, mantendo a saúde vinculada apenas à previdência social.
- 04) O movimento da Reforma Sanitária ocorreu na esfera acadêmica, sem articulação com movimentos sociais ou participação popular.
- 08) A 8ª Conferência Nacional de Saúde consolidou a proposta de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade.

☐

02- Um município brasileiro apresenta elevados índices de internações por doenças diarreicas em crianças menores de cinco anos. O relatório epidemiológico aponta que grande parte da população vive em áreas sem saneamento básico, com coleta de lixo irregular e baixa escolaridade materna. Além disso, há concentração de famílias em ocupações precárias e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Com base no caso descrito, assinale o que for correto.

- 01) As condições de saneamento, moradia e escolaridade materna configuram determinantes sociais que influenciam diretamente o processo saúde-doença observado.
- 02) A dificuldade de acesso aos serviços de saúde agrava a vulnerabilidade das crianças, limitando a prevenção e o tratamento adequado.
- 04) A alta incidência de doenças diarreicas pode ser explicada pela alta circulação de microrganismos patogênicos, sem relação com fatores sociais ou ambientais.
- 08) A situação descrita evidencia que desigualdades sociais produzem iniquidades em saúde, tornando determinados grupos populacionais mais expostos e suscetíveis às doenças.

☐

03- Durante visita domiciliar realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família, uma agente comunitária identificou um idoso hipertenso e diabético, que recentemente recebeu alta hospitalar após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O paciente apresenta limitações motoras, necessidade de acompanhamento multiprofissional e dificuldades socioeconômicas. A família, pouco informada sobre os cuidados, solicitou orientações e apoio. Considerando o princípio da integralidade da assistência no SUS, assinale o que for correto.

- 01) O encaminhamento para fisioterapia, acompanhamento multiprofissional (médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro) e apoio domiciliar expressa a integralidade, ao articular ações de reabilitação e recuperação.
- 02) A integralidade é alcançada por meio da atenção básica, não sendo necessária a incorporação dos serviços de média e alta complexidade.
- 04) A integralidade implica também orientar a família sobre o autocuidado e a prevenção de complicações, articulando promoção e prevenção à reabilitação do paciente.
- 08) A integralidade se concretiza com o tratamento hospitalar adequado ao paciente durante a fase aguda do AVC, sendo dispensada a articulação com outros níveis de atenção.

☐

04- Um médico veterinário sanitaria foi convidado a participar de um seminário sobre políticas públicas de saúde indígena. Durante a apresentação, destacou que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra o SUS, com princípios próprios que respeitam especificidades culturais e garantem a articulação com a rede geral de serviços de saúde. Considerando a Lei nº 8.080/1990 e suas alterações, assinale o que for correto.

- 01) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve funcionar de forma integrada ao SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
- 02) O Subsistema pode desconsiderar práticas culturais, como saberes tradicionais, sempre que não coincidirem com o modelo biomédico hegemônico, já que a prioridade é padronizar protocolos clínicos para as populações indígenas.
- 04) O financiamento do Subsistema é de responsabilidade da União, podendo contar com participação complementar de Estados, Municípios e instituições governamentais e não governamentais.
- 08) A participação dos povos indígenas em instâncias colegiadas de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde (como Conselhos de Saúde) é direito garantido pela lei.

☐

05- A Portaria nº 1.378/2013 regulamenta a Política Nacional de Vigilância em Saúde no âmbito do SUS, estabelecendo princípios, diretrizes e responsabilidades. Com base nesse documento, assinale o que for correto.

- 01) A Vigilância em Saúde deve articular ações de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, em saúde do trabalhador e da situação de saúde da população, com caráter integrador e intersetorial.
- 02) Entre seus princípios estão: integralidade, descentralização, participação social, direito à informação e uso da epidemiologia para análise da situação de saúde.
- 04) A organização da Vigilância em Saúde deve ser descentralizada, hierarquizada e regionalizada, garantindo a integração entre os serviços e a atuação contínua em todos os níveis de atenção.
- 08) A Política Nacional de Vigilância em Saúde prevê a produção, análise e disseminação de informações em saúde como base para a tomada de decisão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços.

☐

06- Com base nos marcos legais do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A regionalização concentra a gestão dos serviços de saúde nos estados, substituindo a descentralização municipal.
- 02) A descentralização busca aproximar a gestão dos serviços de saúde dos usuários, sendo os municípios os principais responsáveis pela execução das ações.
- 04) A integralidade no SUS envolve o reconhecimento das necessidades dos usuários e a articulação das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
- 08) A participação da comunidade se concretiza por meio dos conselhos e conferências de saúde, garantindo representação social na gestão do SUS.

☐

07- Com base nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e sua relação com as iniquidades em saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais da saúde consideram apenas aspectos ambientais e não incluem variáveis socioeconômicas e educacionais.
- 02) A atuação sobre os determinantes sociais deve ser responsabilidade primária do setor saúde, sem necessidade de articulação com outras políticas públicas.
- 04) A compreensão dos determinantes sociais da saúde permite que políticas públicas atuem nas causas estruturais das iniquidades, extrapolando a oferta de serviços de saúde curativos.
- 08) Fatores como renda, escolaridade, raça, moradia e trabalho influenciam diretamente o processo saúde-doença e a expectativa de vida da população.

☐

08- As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no SUS visando superar a fragmentação da atenção e efetivar a integralidade do cuidado. Com base em suas características e diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) As RAS devem ser organizadas com base no reconhecimento dos territórios, a partir das necessidades de saúde das populações adscritas.
- 02) A Atenção Primária à Saúde é reconhecida como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede, sendo a principal porta de entrada do SUS.
- 04) Um dos mecanismos de articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde dentro das RAS é o sistema de referência e de contrarreferência.
- 08) As RAS são estruturas organizadas exclusivamente em hospitais de média e alta complexidade, sendo acessadas após regulação estadual.

☐

09- O planejamento estratégico é um instrumento fundamental para a gestão e organização de sistemas e serviços de saúde, permitindo decisões mais assertivas. Com base em suas diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento estratégico parte da compreensão da realidade para definir objetivos, metas e estratégias voltadas à transformação das situações de saúde.
- 02) A análise situacional é uma etapa central do planejamento estratégico, pois permite gerar um diagnóstico amplo de natureza social, organizacional e de saúde.
- 04) O planejamento estratégico orienta a tomada de decisão com base em prioridades pactuadas coletivamente, considerando as oportunidades e a capacidade de intervenção dos sujeitos.
- 08) Diferentemente dos padrões normativos, o planejamento estratégico em saúde reconhece a complexidade dos territórios e valoriza a participação de diversos atores na construção das ações.

☐

10- A vigilância em saúde impõe articulação entre ações de monitoramento, prevenção e controle de riscos à saúde. Com base nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância hospitalar atua de forma independente das demais esferas da vigilância em saúde, sendo voltada exclusivamente ao ambiente intra-hospitalar.
- 02) A vigilância em saúde na atenção terciária contribui para a segurança do paciente e a qualidade do cuidado.
- 04) A notificação compulsória de agravos e doenças deve ser realizada também em serviços hospitalares, como parte das responsabilidades clínicas e éticas das equipes de saúde.
- 08) Nos hospitais, as ações de vigilância se restringem ao monitoramento de infecções, não envolvendo vigilância epidemiológica, sanitária ou eventos adversos.

☐

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Segundo o Manual de Gestaç o de Alto Risco do Minist rio da Sa de, 2022, a eclampsia   uma emerg ncia obst trica que requer atendimento imediato. As bases do tratamento incluem: a manuten  o da fun  o cardiorrespirat ria, o controle das convuls es, a preven  o de sua recorr ncia, a corre  o da hipoxemia e da acidose materna, o controle da hipertens o arterial grave e o desencadeamento do parto. Quanto aos passos no manejo da convuls o ecl mptica, assinale o que for correto.

- 01) Medir a satura  o de oxig nio e administrar O₂ a 8-10 L/min.
- 02) Recolher amostras de sangue e urina para a avalia  o laboratorial.
- 04) Administrar sulfato de magn sio.
- 08) Inserir um cateter vesical de demora.

☐

12- De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertens o Arterial - 2025, a hipertens o arterial (HA)   uma doen a cr nica n o transmiss vel (DCNT) definida por n veis press ricos em que os benef cios do tratamento (n o medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condi  o multifatorial, dependente de fatores gen ticos/epigen ticos, ambientais e sociais, caracterizada por eleva  o persistente da press o arterial. Considerando a classifica  o da press o arterial medida em consult rio a partir de 18 anos de idade (Classifica  o, PAS mmHg e PAD mmHg), assinale o que for correto.

- 01) Pr  hipertens o: PAS 120-139 mmHg e/ou PAD 80-89 mmHg.
- 02) HA Est gio 2: PAS 160-179 mmHg e/ou PAD 100-109 mmHg.
- 04) HA Est gio 3: PAS ≥ 180 mmHg) e/ou PAD 110 mmHg.
- 08) HA Est gio 1: PAS 130-139 mmHg e/ou PAD 85-89 mmHg.

☐

13- Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2025, o diagn stico de diabetes mellitus (DM) deve ser estabelecido pela identifica  o de hiperglic mia. Para isso, podem ser usados a glic mia plasm tica de jejum (GJ), o teste de toler ncia   glicose por via oral (TTGO) e a hemoglobina glicada (HbA1c). De acordo com os crit rios laboratoriais para diagn stico de DM, assinale o que for correto.

- 01) Glic mia de jejum ≥ 126 mg/dL.
- 02) HbA1c (%) $\geq 6,5$.
- 04) Glic mia de ap s 2 horas no TTGO > 180 mg/dL.
- 08) Glic mia ao acaso ≥ 126 mg/dL na presen a de sintomas.

☐

14- A hipertens o arterial (HA) n o controlada continua sendo um fator de risco cardiovascular (FRCV) amplamente prevalente no Brasil e no mundo. Diante disso, a forma  o de uma equipe multiprofissional, com a  es integradas, constitui uma estrat gia adequada de enfrentamento. Entre as a  es da equipe no cuidado ao paciente com HAS, conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertens o Arterial - 2020, assinale o que for correto.

- 01) No contexto da aten  o prim ria ao hipertenso, compete ao m dico realizar diagn stico, estratifica  o de risco, conduta terap utica n o farmacol gica e farmacol gica, pelo menos duas vezes por ano.
- 02) Entre os membros da equipe multiprofissional, devem estar inclu dos profissionais de educa  o f sica e fisioterapia, com o intuito de reduzir o comportamento sedent rio e estimular a reabilita  o quando necess rio.
- 04) O cuidado de enfermagem deve ser centrado na pessoa, ampliando o acesso a informa  es b sicas, de forma compreens vel e que auxilie na decis o pelo autocuidado, por meio de a  es individuais e coletivas, como consultas de enfermagem, visitas domiciliares e atividades educacionais em grupo.
- 08) No  mbito da equipe multiprofissional, o profissional de educa  o f sica deve recomendar a redu  o do comportamento sedent rio e estimular a pr tica regular de atividade f sica, visando   aquisi  o de h bitos saud veis e   manuten  o da qualidade de vida na comunidade.

☐

15- Em rela  o  s condutas previstas nos princ pios fundamentais do c digo de  tica dos profissionais de enfermagem, segundo a resolu  o COFEN n  564/2017, assinale o que for correto.

- 01)   vedado valer-se, quando no exerc cio da profiss o, de mecanismos de coa  o, omiss o ou suborno, com pessoas f sicas ou jur dicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.
- 02)   permitido que seu nome conste em escalas de trabalho de institui  es ou estabelecimentos sem a devida vincula  o trabalhista pela Consolida  o das Leis de Trabalho (CLT).
- 04)   vedado executar atividades que n o sejam de sua compet ncia t cnica, cient fica,  tica ou legal, ou que n o ofere am seguran a ao profissional,   pessoa,   fam lia e   coletividade.
- 08)   permitido utilizar o poder conferido pela posi  o ou cargo para impor ou induzir favorecimento pol tico, desde que em benef cio coletivo.

☐

16- Segundo as Diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação aos passos da estabilização e reanimação do recém-nascido (RN) ≥ 34 semanas na sala de parto, assinale o que for correto.

- 01) A aspiração de boca e narinas está reservada apenas ao RN em que haja suspeita de obstrução de vias aéreas por excesso de secreções.
- 02) Considera-se adequada a frequência cardíaca (FC) ≥ 80 bpm nos primeiros minutos após o nascimento. A bradicardia é definida como FC < 60 bpm.
- 04) Ao avaliar a respiração por meio da expansão torácica ou da presença de choro, a frequência respiratória espontânea deverá ser ≥ 30 irpm, com movimentos regulares e suficientes para manter a FC > 80 bpm.
- 08) Pré-aquecer a sala de parto e a sala destinada aos procedimentos de estabilização e reanimação, mantendo temperatura ambiente entre 23 °C a 25 °C.

☐

17- Segundo o Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde (2022), a hiperglicemia na gestação deve ser investigada no início e na metade dela. O diagnóstico na gravidez, assim como o consequente controle dos níveis glicêmicos, reduz as complicações para a mãe e seu filho. De acordo com as recomendações para diagnóstico da hiperglicemia na gestação, em relação à glicemia de jejum (GJ) na primeira consulta de pré-natal, assinale o que for correto.

- 01) Glicemia de jejum entre 126 mg/dL e 180 mg/dL: diabetes mellitus gestacional.
- 02) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL: indica diabetes mellitus pré-existente diagnosticado na gestação.
- 04) Glicemia de jejum entre 92 mg/dL e 125 mg/dL: diabetes mellitus gestacional.
- 08) TOTG-75 g: para o DMG, considerar os limites de 92 mg/dL, 180 mg/dL e 153 mg/dL, respectivamente, para GJ, uma hora e duas horas, sendo necessário pelo menos um valor alterado para o diagnóstico.

☐

18- Conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 2020, frente ao algoritmo de atendimento na Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TSVP) em adultos, assinale o que for correto.

- 01) No momento da primeira desfibrilação, se o desfibrilador for bifásico, deverá ser aplicado dose de 360 J.
- 02) A primeira dose de Amiodarona IV/IO deverá ser um bolus de 300 mg.
- 04) A Epinefrina deverá ser administrada no segundo ciclo de RCP e na segunda desfibrilação, caso não haja reversão no primeiro ciclo.
- 08) A segunda dose de Amiodarona IV/IO deverá ser um bolus de 150 mg.

☐

19- Conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 2020, em relação aos cuidados pós-PCR em adultos que apresentaram Retorno da Circulação Espontânea (RCE), assinale o que for correto.

- 01) Para controle dos parâmetros respiratórios, deve-se iniciar com 10 ventilações por minuto, mantendo a saturação de O₂ entre 92% e 98%.
- 02) Deve ser realizado um Eletrocardiograma (ECG).
- 04) A pressão arterial deve ser mantida por meio de infusão de cristaloides ou vasopressores, visando uma pressão arterial sistólica > 90 mmHg ou uma pressão arterial média > 65 mmHg.
- 08) Para controle dos parâmetros respiratórios, deve-se iniciar com 12 ventilações por minuto, mantendo a pressão parcial de CO₂ entre 30 e 35 mmHg.

☐

20- De acordo com as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal do Ministério da Saúde, em relação às estratégias e métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto, assinale o que for correto.

- 01) A injeção de água estéril deve ser usada para o alívio da dor no parto.
- 02) A acupuntura pode ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver profissional habilitado e disponível para tal.
- 04) Sempre que possível, deve ser oferecido à mulher a imersão em água com método de alívio da dor durante o trabalho de parto.
- 08) Os métodos farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização de métodos não farmacológicos.

☐

21- A Segurança do Paciente é um atributo que fortalece a qualidade do cuidado, e tem adquirido grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Uma queda de leito/cama com dano ao paciente é um incidente.
- 02) A interrupção por um profissional da enfermagem durante o preparo de um medicamento errado é considerado um evento adverso.
- 04) Evento sentinela é a ocorrência inesperada ou variação do processo envolvendo óbito, lesão física grave ou psicológica, ou risco dos mesmos.
- 08) Reação adversa ao medicamento é um dano inesperado que resulta de uma ação ou tratamento justificado em que o processo correto, para o contexto em que o evento ocorreu, foi implementado.

☐

22- Sobre precauções e isolamento, analise as alternativas e assinale o que for correto.

- 01) As precauções padrão devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico ou da suspeita de infecção.
- 02) O isolamento por contato é indicado para pacientes com infecções como *Clostridium difficile*, infecções por MRSA e escabiose.
- 04) O uso de máscara N95/PFF2 é obrigatório para todos os profissionais que entrarem em contato com pacientes sob precauções por gotículas.
- 08) A precaução por aerossóis é recomendada para doenças como sarampo e varicela.

☐

23- Sobre a dengue, arbovirose endêmica no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A infecção pelo vírus da dengue, quando sintomática, pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.
- 02) Sangramento de mucosa, hipotensão postural ou lipotímia, vômitos persistentes, dor abdominal intensa, referida ou à palpação, e contínua são alguns dos sinais de alerta em caso de dengue.
- 04) O exantema ocorre aproximadamente em 50% dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros.
- 08) O quadro clínico da dengue é consequência de uma resposta imune, envolvendo leucócitos, principalmente macrófagos e monócitos, produção de citocinas e imunocomplexos, determinando um processo inflamatório endotelial generalizado.

☐

24- Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) fundamenta-se no princípio da individualização do cuidado, assegurando que cada paciente seja assistido de acordo com suas necessidades singulares. Ainda que múltiplos pacientes apresentem o mesmo diagnóstico, a elaboração do plano de cuidados é direcionada às particularidades do quadro clínico de cada indivíduo, promovendo uma assistência integral, personalizada e eficaz. Diante do exposto, assinale o que for correto.

- 01) Apesar de sua relevância teórica, a SAE é considerada inviável devido à falta de recursos humanos e de materiais em muitos hospitais.
- 02) A SAE exerce impacto significativo na qualidade da assistência, uma vez que a maioria dos tratamentos hospitalares demanda personalização.
- 04) A SAE é relevante para hospitais que atendem pacientes de alta complexidade, não sendo necessária em locais de cuidados primários.
- 08) A SAE, ao viabilizar intervenções adaptadas às necessidades específicas de cada paciente, qualifica o cuidado, promovendo tratamentos mais eficazes e seguros.

☐

25- A Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), que dispõe sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, publicada em 11 de novembro de 2005 e atualizada em 13 de abril de 2022. Seu objetivo é estabelecer diretrizes básicas para a adoção de medidas de proteção voltadas à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, assim como daqueles que atuam em atividades de promoção e assistência à saúde em geral. De acordo com esta norma, assinale o que for correto.

- 01) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho.
- 02) Os trabalhadores devem comunicar em até 96 horas todo acidente ou incidente, com ou sem possibilidade de exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
- 04) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
- 08) Em relação aos riscos biológicos, considera-se a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, sejam eles os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.

☐

26- A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial à saúde mental. Com base nessa Lei, assinale o que for correto.

- 01) Constitui-se como um dos direitos da pessoa com transtorno mental ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
- 02) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores com transtornos mentais, com a participação da sociedade e da família.
- 04) São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória.
- 08) É permitida a internação de pacientes com transtornos mentais em instituições com características asilares.

☐

27- O desafio de prevenir danos aos usuários dos serviços de saúde, bem como os prejuízos decorrentes de falhas nos processos ou nas estruturas assistenciais, tem se tornado cada vez mais complexo. Diante disso, torna-se imprescindível a constante atualização de protocolos específicos relacionados a critérios diagnósticos e às medidas de prevenção voltadas à redução das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Considerando a prevenção como prática essencial à qualidade do cuidado, assinale o que for correto.

- 01) O posicionamento inadequado do paciente não impacta o surgimento da pneumonia, sendo o decúbito de apenas 30° suficiente e com maior adesão.
- 02) Para a prevenção da Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), não se recomenda a tricotomia de rotina. Caso seja necessária, deve ser realizada imediatamente antes do procedimento cirúrgico, utilizando tricotomizadores elétricos em local apropriado, fora da sala de cirurgia.
- 04) Estabelecer rotina de monitoramento e vigilância, considerando a frequência de utilização de cateteres e os riscos associados, especialmente em contextos como determinados tipos de cirurgias, obstetrícia e unidades de terapia intensiva.
- 08) Para a estabilização do cateter vascular, podem ser utilizadas fitas adesivas não estéreis, a exemplo do esparadrapo comum, fitas do tipo microporosa, e coberturas de cateteres, como medida de prevenção de infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais.

☐

28- Sobre a implementação do processo de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) A consulta de enfermagem deve ser organizada e registrada conforme as etapas do processo de enfermagem.
- 02) A execução das cinco etapas do processo de enfermagem, organizadas de maneira inter-relacionada, interdependente, recorrente e cíclica, é privativo ao enfermeiro.
- 04) A etapa de planejamento de enfermagem não inclui a priorização de diagnósticos de enfermagem, a determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde e a tomada de decisão terapêutica.
- 08) Os cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares, fazem parte da etapa de implementação de enfermagem.

☐

29- Com base no Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, o qual dispõe sobre o exercício da Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) A atividade de Enfermagem deve estar incluída no planejamento e programação das instituições e serviços de saúde.
- 02) O técnico de enfermagem deve assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos a pacientes em estado grave, sempre sob supervisão do enfermeiro.
- 04) A prevenção e o controle sistemático da infecção hospitalar são atividades privativas do enfermeiro.
- 08) Aos profissionais titulares de diploma ou certificados de obstetritz ou de enfermeira obstétrica compete, durante a assistência ao parto, a realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária.

☐

30- A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. No primeiro semestre de 2024, diversos países, incluindo o Brasil, registraram um aumento de casos da doença. Analise as alternativas e assinale o que for correto.

- 01) A maioria das pessoas não consegue se recuperar da coqueluche sem sequelas e maiores complicações, sendo o desenvolvimento de hérnias abdominais a consequência mais grave.
- 02) O agente etiológico é a bactéria *Bordetella pertussis*, que tem o ser humano como reservatório natural.
- 04) O principal modo de transmissão é pelo contato direto entre a pessoa doente e a pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção da orofaringe eliminadas durante a fala, a tosse e o espirro. Embora menos frequente, pode ocorrer transmissão por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes.
- 08) As crianças, principalmente menores de 6 meses, constituem o grupo de indivíduos particularmente propensos a apresentar formas graves, muitas vezes letais.

☐