



# **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA**

## **COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO**

## **PROCESSO DE SELEÇÃO**

## **RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL**

**EDITAL HU/UEPG Nº 01/2025 – EDITAL FMS/NEP Nº 01/2025**

**CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – ESTOMATOLOGIA – PERIODONTIA  
INTENSIVISMO – NEONATOLOGIA – SAÚDE DO IDOSO – SAÚDE COLETIVA**

## **GRUPO I: ODONTOLOGIA**

**NOME COMPLETO:**

## **INSTRUÇÕES GERAIS**

- ⦿ Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
  - ⦿ As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.
  - ⦿ O prazo determinado para resolução desta prova é de **TRÊS HORAS**, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos Cadernos de Questões, incluído o tempo para o preenchimento do Cartão de Respostas.
  - ⦿ Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  
Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 16h15min.
  - ⦿ É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas.
  - ⦿ É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.

## **INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS**

- ➲ CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de inscrição, área.
  - ➲ ASSINE apenas no local indicado.
  - ➲ PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do Cartão de Respostas em caso de erro ou rasura.
  - ➲ Siga as instruções quanto ao preenchimento do Cartão de Respostas.
  - ➲ Todas as informações acima constam no Edital de Abertura.

**Observação:** você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.  
**ATENÇÃO!** Só a destaque depois de ter entregue o Cartão de Respostas ao fiscal.

UAPG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA  
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO  
PROCESSO DE SELEÇÃO – RESIDÊNCIA UNI E MULTIPROFISSIONAL – HU/UEPG e FMS/NEP  
GRUPO I: ODONTOLOGIA

**PAPELERA PARA ANOTACÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL**

## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no Cartão de Respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do Cartão de Respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
- 02) Alternativa errada.
- 04) Alternativa errada.
- 08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

65
<input checked="" type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8
<input checked="" type="checkbox"/> 9



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
- 02) **Alternativa correta.** ✓
- 04) **Alternativa correta.** ✓
- 08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

70
<input type="checkbox"/> 0
<input checked="" type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3
<input checked="" type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9



## QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

**01-** A Reforma Sanitária Brasileira, iniciada na década de 1970, criticava o modelo previdenciário de atenção à saúde – excludente e fragmentado – e culminou na 8<sup>a</sup> Conferência Nacional de Saúde (1986). Sobre esse processo, assinale o que for correto.

- 01) A Reforma Sanitária defendia a saúde como direito universal e dever do Estado, contrapondo-se ao modelo previdenciário vigente até então.
- 02) A Constituição de 1988 não incorporou as propostas da Reforma Sanitária, mantendo a saúde vinculada apenas à previdência social.
- 04) O movimento da Reforma Sanitária ocorreu na esfera acadêmica, sem articulação com movimentos sociais ou participação popular.
- 08) A 8<sup>a</sup> Conferência Nacional de Saúde consolidou a proposta de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade.

**02-** Um município brasileiro apresenta elevados índices de internações por doenças diarréicas em crianças menores de cinco anos. O relatório epidemiológico aponta que grande parte da população vive em áreas sem saneamento básico, com coleta de lixo irregular e baixa escolaridade materna. Além disso, há concentração de famílias em ocupações precárias e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Com base no caso descrito, assinale o que for correto.

- 01) As condições de saneamento, moradia e escolaridade materna configuram determinantes sociais que influenciam diretamente o processo saúde-doença observado.
- 02) A dificuldade de acesso aos serviços de saúde agrava a vulnerabilidade das crianças, limitando a prevenção e o tratamento adequado.
- 04) A alta incidência de doenças diarréicas pode ser explicada pela alta circulação de microrganismos patogênicos, sem relação com fatores sociais ou ambientais.
- 08) A situação descrita evidencia que desigualdades sociais produzem iniquidades em saúde, tornando determinados grupos populacionais mais expostos e suscetíveis às doenças.

**03-** Durante visita domiciliar realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família, uma agente comunitária identificou um idoso hipertenso e diabético, que recentemente recebeu alta hospitalar após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O paciente apresenta limitações motoras, necessidade de acompanhamento multiprofissional e dificuldades socioeconômicas. A família, pouco informada sobre os cuidados, solicitou orientações e apoio. Considerando o princípio da integralidade da assistência no SUS, assinale o que for correto.

- 01) O encaminhamento para fisioterapia, acompanhamento multiprofissional (médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro) e apoio domiciliar expressa a integralidade, ao articular ações de reabilitação e recuperação.
- 02) A integralidade é alcançada por meio da atenção básica, não sendo necessária a incorporação dos serviços de média e alta complexidade.
- 04) A integralidade implica também orientar a família sobre o autocuidado e a prevenção de complicações, articulando promoção e prevenção à reabilitação do paciente.
- 08) A integralidade se concretiza com o tratamento hospitalar adequado ao paciente durante a fase aguda do AVC, sendo dispensada a articulação com outros níveis de atenção.

**04-** Um médico veterinário sanitaria foi convidado a participar de um seminário sobre políticas públicas de saúde indígena. Durante a apresentação, destacou que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra o SUS, com princípios próprios que respeitam especificidades culturais e garantem a articulação com a rede geral de serviços de saúde. Considerando a Lei nº 8.080/1990 e suas alterações, assinale o que for correto.

- 01) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve funcionar de forma integrada ao SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
- 02) O Subsistema pode desconsiderar práticas culturais, como saberes tradicionais, sempre que não coincidirem com o modelo biomédico hegemônico, já que a prioridade é padronizar protocolos clínicos para as populações indígenas.
- 04) O financiamento do Subsistema é de responsabilidade da União, podendo contar com participação complementar de Estados, Municípios e instituições governamentais e não governamentais.
- 08) A participação dos povos indígenas em instâncias colegiadas de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde (como Conselhos de Saúde) é direito garantido pela lei.

**06-** Com base nos marcos legais do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A regionalização concentra a gestão dos serviços de saúde nos estados, substituindo a descentralização municipal.
- 02) A descentralização busca aproximar a gestão dos serviços de saúde dos usuários, sendo os municípios os principais responsáveis pela execução das ações.
- 04) A integralidade no SUS envolve o reconhecimento das necessidades dos usuários e a articulação das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
- 08) A participação da comunidade se concretiza por meio dos conselhos e conferências de saúde, garantindo representação social na gestão do SUS.

**05-** A Portaria nº 1.378/2013 regulamenta a Política Nacional de Vigilância em Saúde no âmbito do SUS, estabelecendo princípios, diretrizes e responsabilidades. Com base nesse documento, assinale o que for correto.

- 01) A Vigilância em Saúde deve articular ações de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, em saúde do trabalhador e da situação de saúde da população, com caráter integrador e intersetorial.
- 02) Entre seus princípios estão: integralidade, descentralização, participação social, direito à informação e uso da epidemiologia para análise da situação de saúde.
- 04) A organização da Vigilância em Saúde deve ser descentralizada, hierarquizada e regionalizada, garantindo a integração entre os serviços e a atuação contínua em todos os níveis de atenção.
- 08) A Política Nacional de Vigilância em Saúde prevê a produção, análise e disseminação de informações em saúde como base para a tomada de decisão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços.

**07-** Com base nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e sua relação com as iniquidades em saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais da saúde consideram apenas aspectos ambientais e não incluem variáveis socioeconômicas e educacionais.
- 02) A atuação sobre os determinantes sociais deve ser responsabilidade primária do setor saúde, sem necessidade de articulação com outras políticas públicas.
- 04) A compreensão dos determinantes sociais da saúde permite que políticas públicas atuem nas causas estruturais das iniquidades, extrapolando a oferta de serviços de saúde curativos.
- 08) Fatores como renda, escolaridade, raça, moradia e trabalho influenciam diretamente o processo saúde-doença e a expectativa de vida da população.

**09-** O planejamento estratégico é um instrumento fundamental para a gestão e organização de sistemas e serviços de saúde, permitindo decisões mais assertivas. Com base em suas diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento estratégico parte da compreensão da realidade para definir objetivos, metas e estratégias voltadas à transformação das situações de saúde.
- 02) A análise situacional é uma etapa central do planejamento estratégico, pois permite gerar um diagnóstico amplo de natureza social, organizacional e de saúde.
- 04) O planejamento estratégico orienta a tomada de decisão com base em prioridades pactuadas coletivamente, considerando as oportunidades e a capacidade de intervenção dos sujeitos.
- 08) Diferentemente dos padrões normativos, o planejamento estratégico em saúde reconhece a complexidade dos territórios e valoriza a participação de diversos atores na construção das ações.

**08-** As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no SUS visando superar a fragmentação da atenção e efetivar a integralidade do cuidado. Com base em suas características e diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) As RAS devem ser organizadas com base no reconhecimento dos territórios, a partir das necessidades de saúde das populações adscritas.
- 02) A Atenção Primária à Saúde é reconhecida como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede, sendo a principal porta de entrada do SUS.
- 04) Um dos mecanismos de articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde dentro das RAS é o sistema de referência e de contrarreferência.
- 08) As RAS são estruturas organizadas exclusivamente em hospitais de média e alta complexidade, sendo acessadas após regulação estadual.

**10-** A vigilância em saúde impõe articulação entre ações de monitoramento, prevenção e controle de riscos à saúde. Com base nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância hospitalar atua de forma independente das demais esferas da vigilância em saúde, sendo voltada exclusivamente ao ambiente intra-hospitalar.
- 02) A vigilância em saúde na atenção terciária contribui para a segurança do paciente e a qualidade do cuidado.
- 04) A notificação compulsória de agravos e doenças deve ser realizada também em serviços hospitalares, como parte das responsabilidades clínicas e éticas das equipes de saúde.
- 08) Nos hospitais, as ações de vigilância se restringem ao monitoramento de infecções, não envolvendo vigilância epidemiológica, sanitária ou eventos adversos.

## QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** Com relação aos acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes, de acordo com as normas de biossegurança preconizadas pelo Ministério da Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os acidentes com risco de exposição ao HIV constituem um atendimento de urgência, em função da necessidade de início precoce da profilaxia pós exposição, em até 72 horas, para maior eficácia da intervenção.
- 02) As pessoas que tenham sofrido lesões ou cortes devem ser avaliadas quanto à necessidade de imunização para tétano.
- 04) Nos casos de exposições percutânea e cutânea, recomenda-se como primeira conduta após a exposição a material biológico, a lavagem exaustiva do local exposto com soluções como álcool 70%, éter ou glutaraldeído.
- 08) Os acidentes com exposição a material biológico são considerados agravos de notificação compulsória.

**13-** Com relação a quadros de urgência e emergência em atendimentos odontológicos em ambiente hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A conduta inicial frente a um paciente com hipotensão ortostática inclui o posicionamento do paciente em posição supina com as pernas elevadas acima do nível da cabeça e monitorização dos sinais vitais.
- 02) Pacientes que apresentem aspiração de corpo estranho com obstrução completa da via aérea, porém permanecem acordados, devem ser manejados com manobra de Heimlich.
- 04) São considerados casos de emergência odontológica dor de origem dentária aguda como quadros de pulpite, sangramentos não controlados, trauma dentário com avulsão.
- 08) Quadros de urgência são considerados situações em que se apresenta um risco imediato de morte ou de dano irreversível ao paciente.

**12-** A imunização de profissionais de saúde faz parte das medidas de biossegurança essenciais para atuação clínica. De acordo com o Ministério da Saúde e com o Conselho Federal de Odontologia, em relação ao esquema vacinal para cirurgiões-dentistas, assinale o que for correto.

- 01) A vacina da hepatite B é administrada em três doses (0, 1 e 6 meses) e os profissionais devem ser testados para a presença de anticorpos anti-HBs um a dois meses após a última dose do esquema vacinal.
- 02) Doses de reforço da vacina dT (difteria e tétano), após a última dose do esquema vacinal básico, devem ser feitas a cada 4 anos.
- 04) A vacina tríplice viral é fundamental para profissionais da saúde e protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
- 08) Segundo a ANVISA, as vacinas consideradas obrigatórias para todos os profissionais da odontologia são: hepatite B, pneumocócica, influenza, tríplice viral, febre amarela, dupla adulto (difteria e tétano), COVID-19.


**14-** O atendimento do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar envolve a assistência ao paciente cuja doença sistêmica possa ser fator de risco para agravamento e/ou instalação de doença bucal, ou cuja doença bucal possa ser fator de risco para agravamento e/ou instalação de doença sistêmica. Com relação à assistência odontológica em ambiente hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A investigação de doença periodontal e xerostomia é recomendada em pacientes diabéticos, uma vez que essas são manifestações bucais frequentes nessa condição.
- 02) Devem ser avaliados pela equipe de odontologia hospitalar pacientes hospitalizados com dores orofaciais crônicas que requeiram investigação diagnóstica multidisciplinar.
- 04) Os cuidados bucais, quando realizados adequadamente, podem auxiliar na redução do aparecimento de pneumonia associada ao uso de ventilação mecânica em pacientes em Unidade de Terapia Intensiva.
- 08) Em pacientes em cuidados paliativos, o cirurgião-dentista atua principalmente em medidas de conforto que podem incluir cuidados como prevenção e alívio dos efeitos da radioterapia e quimioterapia, controle da halitose e das alterações de saliva.



**16-** O uso da anestesia geral em Odontologia é indicado em situações específicas. Considerando as indicações e contraindicações do uso da anestesia geral em procedimentos odontológicos eletivos, assinale o que for correto.

- 01) Pacientes com hipertensão arterial no momento do ato cirúrgico são candidatos ao uso da anestesia geral, pois esta promove redução imediata da pressão arterial.
- 02) O uso de anestesia geral pode ser realizado em consultório odontológico desde que o cirurgião-dentista possua treinamento específico e materiais de suporte básico de vida.
- 04) É indicada para pacientes com deficiência física ou mental grave que impossibilitem um tratamento convencional.
- 08) É indicada em pacientes excessivamente temerosos ou fóbicos, bem como em portadores de distúrbios psiquiátricos graves que impeçam o tratamento convencional.



---

**15-** Pacientes com comprometimento sistêmico podem apresentar sinais clínicos característicos, detectáveis durante o exame físico. Considerando essas correlações, assinale o que for correto.

- 01) Palidez das membranas mucosas pode ser observada em casos severos de anemia.
- 02) No escorbuto, a deficiência de vitamina C prejudica a síntese de colágeno, enfraquecendo as paredes vasculares, o que pode se manifestar em petéquias disseminadas e equimoses.
- 04) A presença de linfonodos cervicais aumentados, com consistência firme à pétreia e indolores, pode indicar disseminação metastática, como em casos de carcinoma de células escamosas bucal.
- 08) A icterícia é caracterizada pela falta de bilirrubina na corrente sanguínea, o que pode ocasionar aspecto amarelado, frequentemente manifestado em pacientes com função hepática prejudicada.



**17-** Durante o exame clínico odontológico, algumas doenças sistêmicas podem apresentar manifestações bucais que contribuem para o diagnóstico. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A Esclerose Sistêmica (esclerodermia) não apresenta repercussões na cavidade bucal, restringindo-se a manifestações exclusivamente cutâneas e articulares.
- 02) A Telangiectasia Hemorrágica Hereditária (Síndrome de Osler-Weber-Rendu) pode se manifestar por múltiplas lesões vasculares puntiformes na mucosa bucal, frequentemente associadas à epistaxe recorrente.
- 04) O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) pode apresentar exantema em região malar e nasal e úlceras bucais irregulares, geralmente acompanhadas de sintomas sistêmicos como fadiga, febre e artralgia.
- 08) O Lúpus Eritematoso Cutâneo Crônico pode envolver a mucosa bucal, apresentando placas eritematosas semelhantes ao líquen plano erosivo, frequentemente associadas à fotosensibilidade.

**19-** Sobre os antissépticos utilizados na prática odontológica, assinale o que for correto.

- 01) Os iodóforos são os que possuem o mais amplo espectro de ação antisséptica, sendo efetivos contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, vírus (exceto enterovírus), bacilo da tuberculose, fungos e apresentam alguma atividade contra os esporos (nas concentrações utilizadas para antisepsia geralmente, não têm ação esporicida).
- 02) A clorexidina possui ação antimicrobiana de nível intermediário, com efeito residual, forte afinidade pelos tecidos e menor interferência da matéria orgânica em sua ação.
- 04) O triclosan apresenta maior atividade bactericida contra bactérias Gram-positivas do que contra Gram-negativas, mas também possui atividade contra micobactérias e leveduras como *Candida* spp.
- 08) O álcool (sob a forma gel ou líquida, com 1 a 3% de glicerina) é indicado para os casos em que as mãos estão com sujidade e umidade.


**18-** Um paciente em uso de anticoagulação oral é encaminhado para extração dentária. Considerando as evidências atuais sobre o manejo de anticoagulantes em procedimentos odontológicos, assinale o que for correto.

- 01) Pacientes em uso de rivaroxabana não necessitam de ajuste ou suspensão da medicação em nenhuma circunstância, pois seu risco de sangramento é irrelevante para procedimentos odontológicos.
- 02) A continuidade da anticoagulação em procedimentos odontológicos de baixo risco (como a extração de até três dentes) pode ser preferível, desde que o INR esteja dentro da faixa terapêutica no caso de uso de varfarina.
- 04) Todo paciente em uso de varfarina deve suspender a medicação pelo menos 48 horas antes de qualquer extração dentária, independentemente do número de dentes a serem removidos.
- 08) O uso de agentes hemostáticos tópicos, como bochechos com ácido tranexâmico, pode reduzir o risco de sangramento em pacientes anticoagulados submetidos a extrações dentárias.

**20-** De acordo com os princípios de biossegurança aplicados ao consultório odontológico, assinale o que for correto.

- 01) A microbiota residente é constituída por microrganismos aderidos às camadas profundas da pele, de difícil remoção apenas com água e sabão. Geralmente tem baixa patogenicidade, mas pode causar infecção em indivíduos suscetíveis.
- 02) A microbiota transitória é adquirida pelo contato com pacientes e superfícies, coloniza a pele de forma temporária, possui maior potencial invasivo e é a principal responsável pela transmissão cruzada em consultórios odontológicos.
- 04) A higienização das mãos é considerada a medida isolada mais importante para prevenção de infecções em serviços de saúde e deve ser realizada mesmo após o uso de luvas.
- 08) Segundo a Nota Técnica 04/2020 da ANVISA, a higienização das mãos com água e sabonete líquido deve durar entre 40 - 60 segundos, enquanto a fricção com preparação alcoólica a 70% deve durar de 20 - 30 segundos.

**22-** Considerando os conceitos de eficácia e potência de fármacos, analise o gráfico a seguir e assinale o que for correto.



- 01) O fármaco B é mais potente que o fármaco C.
- 02) Apenas o fármaco A é eficaz.
- 04) Os fármacos A e B têm potência equivalente.
- 08) O fármaco A é mais potente que o fármaco B.

**21-** Sobre o uso de analgésicos em Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) A dipirona deve ser evitada em pacientes com história de anemia e leucopenia.
- 02) O ibuprofeno na concentração de 400 mg tem ação analgésica similar à dipirona sem exercer atividade anti-inflamatória.
- 04) A associação da codeína ao paracetamol está indicada para pacientes com baixo limiar de dor que não respondem aos fármacos de ação periférica.
- 08) O paracetamol não está indicado para o controle de dor em pacientes alcoólatras com a função hepática comprometida.

**23-** Em relação aos vasoconstritores utilizados na Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) Epinefrina 1:100.000 equivale a 0,01 mg/ml ou 18 microgramas de vasoconstritor por tubete.
- 02) A prilocaina 3% associada a felipressina 0,03UI/mL pode ser indicada para pacientes que relatam alergia ao bissulfito de sódio.
- 04) Fenilefrina é um vasoconstritor derivado da vasopressina que atua essencialmente em leito venoso, por isso a hemostasia não é tão eficaz quando comparada à epinefrina.
- 08) O uso da epinefrina 1:100.000 pode ser indicado em pacientes hipertensos com pressão arterial menor que 160/100 mmHg para realização de procedimentos que necessitam de controle da hemostasia. Porém, nesse caso, o peso não é utilizado como referência da quantidade máxima permitida.

**25-** A respeito do uso de anti-inflamatórios na Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) Os anti-inflamatórios esteroidais previnem hiperalgésia e seu regime analgésico mais adequado é para o controle da dor já instalada e de intensidade leve.
- 02) Os anti-inflamatórios não esteroidais podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.
- 04) Os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para cicloxygenase 2 devem ser evitados em pacientes portadores de hipertensão arterial, doença cardíaca isquêmica ou com história de acidente vascular encefálico.
- 08) Os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para cicloxygenase 2 são indicados para o controle da dor aguda de intensidade moderada a severa.

**24-** Considerando a farmacocinética, farmacodinâmica e uso dos sais anestésicos em Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) A taxa de ligação à proteínas plasmáticas da lidocaína é menor que a da prilocaina, sendo um dos motivos que justifica o uso da lidocaína como primeira escolha em gestantes.
- 02) A meia-vida plasmática da articaína é mais curta do que a dos demais anestésicos, propiciando uma eliminação mais rápida pelos rins.
- 04) Prilocaina tem atividade vasodilatadora menor que a mepivacaína.
- 08) Lidocaína, mepivacaína, prilocaina, bupivacaína e articaína apresentam na sua estrutura química um grupamento hidrofílico, que é responsável pela difusão do anestésico através da bainha nervosa e um grupamento lipofílico, que permite sua injeção nos tecidos.

**26-** Durante o exame físico intrabucal pode-se observar alterações na mucosa bucal, as quais deverão ser categorizadas dentro das Lesões Fundamentais, possibilitando o agrupamento e a comparação das lesões que ocorrem em boca, além de facilitar a comunicação interprofissional. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) As placas são elevações da superfície da mucosa onde a altura é menor do que a extensão da lesão, sendo presentes nos casos de Candidose pseudomembranosa e Leucoplasia .
- 02) As manchas e máculas são alterações de coloração que ocorrem na mucosa bucal ou na pele, porém as manchas apresentam coloração acastanhada ou enegrecida, enquanto que as máculas apresentam coloração arroxeadas ou avermelhadas, o que demonstra a natureza vascular das máculas.
- 04) Na erosão ocorre perda parcial do tecido epitelial sem expor o tecido conjuntivo subjacente, podendo ser observada nos casos de Glossite Migratória Benigna (Língua Geográfica) e Líquen Plano Erosivo.
- 08) Tanto as vesículas como as bolhas são lesões fundamentais que apresentam aumento de volume tecidual decorrente do acúmulo de líquido no seu interior, estando presentes nos quadros de Herpes Simples.

**27-** Nas técnicas radiográficas intrabucais o filme/película é mantido dentro da boca do paciente no momento da exposição aos raios X. As principais técnicas intrabucais são: técnica radiográfica periapical da bissetriz, técnica radiográfica periapical do paralelismo, técnica radiográfica interproximal e técnica radiográfica oclusal. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) As técnicas periapicais da bissetriz e do paralelismo são indicadas para avaliação do órgão dentário, da região periapical e das estruturas contíguas. Logo, a relação da dentição decidua com a permanente pode ser avaliada por essa técnica.
- 02) A técnica radiográfica interproximal está indicada quando se deseja avaliar radiograficamente as faces proximais de dentes posteriores para pesquisa de cáries proximais e incipientes, excesso ou falta de material restaurador envolvendo as faces proximais; e avaliação imaginológica da crista óssea alveolar.
- 04) A avaliação radiográfica de uma lesão cística extensa na maxila pode ser feita por meio da radiografia oclusal total da maxila. Para tanto, a área de incidência do feixe de raios X deve ser na região de Glabela, a angulação vertical do feixe deve ser de +65° e a angulação horizontal de 0°.
- 08) Para a pesquisa de sialólitos (litíase salivar) associada ao ducto excretor da glândula submandibular, pode ser utilizada a radiografia oclusal total de mandíbula aumentando-se o tempo de exposição aos raios X, o que facilitaria a visualização das calcificações no interior do ducto excretor.

**28-** Paciente masculino, 37 anos, compareceu para tratamento odontológico e, durante o exame clínico inicial, apresentou o seguinte resultado laboratorial de sorologia para Hepatite B, conforme tabela a seguir. Analise as alternativas e assinale o que for correto.

Marcador	Resultado encontrado
HBsAg	Reagente
Anti-HBs	Não reagente
IgM anti-HBc	Reagente
IgG anti-HBc	Não reagente
HBeAg	Reagente
Anti-HBe	Não reagente.

- 01) O resultado da sorologia é condizente com infecção prévia pelo Vírus da Hepatite B ou pela vacinação do paciente contra Hepatite B.
- 02) A sorologia apresentada é condizente com quadro de Infecção Aguda pelo Vírus da Hepatite B.
- 04) As alterações sorológicas indicam quadro de infecção crônica pelo Vírus da Hepatite B, com períodos de inativação e reativação viral.
- 08) Com base na sorologia, espera-se que o paciente apresente ou venha a desenvolver quadro de icterícia, decorrente da elevação dos níveis de bilirrubina na circulação.

**29-** Os exames complementares laboratoriais, tais como hemograma, coagulograma, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, podem ser solicitados pelo cirurgião dentista para auxiliar no diagnóstico de doenças ou para verificar a condição sistêmica do paciente, influenciando o plano de tratamento. Dentro desta temática, assinale o que for correto.

- 01) Paciente do sexo feminino com 10 anos apresentou no hemograma níveis de hemoglobina de 8,6 g/dL (normal 11,5 a 15,5 g/dL), indicando quadro de anemia.
- 02) Paciente masculino com 53 anos apresentou no hemograma número de leucócitos de 18.000/ $\mu$ L, caracterizando quadro de leucocitose.
- 04) Paciente masculino com 66 anos apresentou valores elevados no Tempo de Protrombina, porém o Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada e o Tempo de Sangramento estavam normais. Este fato sugere alterações na via extrínseca da cascata de coagulação.
- 08) Valores elevados de Hemoglobina Glicada (HbA1c) indicam mau controle do quadro de Diabetes mellitus, o que está diretamente associado a maior prevalência e severidade da doença periodontal, reforçando a importância da integração entre o controle sistêmico e a saúde bucal.



**30-** A ressonância magnética (RM) é um exame de diagnóstico por imagem capaz de produzir imagens do corpo humano, em qualquer plano, sem expor o paciente à radiação ionizante. Sobre o uso da RM na odontologia, assinale o que for correto.

- 01) A RM é indicada como exame complementar para avaliar alterações na ATM, principalmente o deslocamento do disco articular e lesões com envolvimento capsular e/ou do ligamento posterior.
- 02) A RM está indicada na avaliação de neoplasias em partes moles e nas glândulas salivares maiores.
- 04) A RM permite a identificação de fraturas radiculares ou perfurações na porção radicular, sem a necessidade de exposição à radiação ionizante.
- 08) No planejamento de implantes dentários, a RM é o exame imaginológico de primeira escolha, pois permite boa visualização tanto dos tecidos mineralizados como dos tecidos moles.



---